

A stylized logo consisting of a crown on top of a pair of sunglasses, rendered in white on a dark red background. The logo is positioned in the upper half of the cover.

*Missbruksbokslut
2003-2007*

mariaberoendecentrum

Inledning

Maria Beroendecentrum har under sin tid som en personalägd verksamhet för beroendevård i Stockholms län kontinuerligt genomfört intervjuer med sina patienter.

När man som patient kommer till oss genomgår man en utredning bestående av tre besök. Vid det tredje besöket, innan man påbörjar behandling, genomförs en ASI-intervju (Addiction Severity Index).

Mellan åren 2003 och 2007 har vi genomfört totalt 3416 ASI-intervjuer. Detta är ett omfattande ASI-material som tagits fram kring människors beroende och missbruk av alkohol och andra droger i Stockholms län.

Vi genomför ASI-intervjuer för att bygga ny kunskap om missbruks- och beroendeproblematik. Problemen är många gånger komplexa – sambandet mellan psykisk och/eller fysisk ohälsa och drogberoende är mycket starkt. De individer vi möter har nästan i alla fall varit i kontakt med någon annan del av sjukvården under kortare eller längre tid, men där har inte deras beroendeproblem adresserats.

Samtidigt är merparten av dem vi möter fungerande samhällsmedborgare – de har eget boende, oftast arbete, körkort, bor med någon som inte är missbrukare etc. Denna bild av drogberoende medmänniskor är viktig att vi har med oss när vi diskuterar förebyggande insatser, vård och rehabilitering. Oroväckande är att en växande andel är unga – var tionde person som kommer till oss med allvarliga beroendeproblem är mellan 18 och 24 år. I den åldersgruppen är också könsfördelningen jämnast (41 procent tjejer, 59 procent killar) – i övriga åldrar är det en dominerande andel män.

Detta bokslut är det första i sitt slag som vi gjort, och vi hoppas kunna lära oss själva och andra i vården mer om våra klienter med detta material.

Sammanfattning

- Huvuddelen av alla patienter har enbart alkohol som huvuddrog
- Tre av fyra har egen bostad
- Bara ett par procent har varit arbetslösa merparten av de senaste tre åren
- Nästan hälften har uppgett att de har haft en långvarig skada eller somatisk sjukdom, vilket vittnar om att många varit i kontakt med primärvården tidigare. Många av dem har fått kroniska sjukdomar av sitt missbruk, som högt blodtryck, diabetes eller liknande.
- Ungefär 8 av 10 har aldrig haft rättsliga problem – dock har 22 procent vid något tillfälle gripits för rattonykterhet.
- Många har varit i kontakt med psykiatrisk slut- eller öppenvård och cirka hälften har tagit läkemedel mot psykiatriska sjukdomar eller problem.
- Allvarlig depression är vanligt hos besökarna, denna siffra är framför allt hög bland kvinnor i gruppen 18-24 år där 7 av 10 upplevt allvarlig depression utan att vara påverkade av alkohol eller droger. 6 av 10 i samma åldersgrupp har också haft allvarligt menade självmordstankar.
- Var femte person av de intervjuade har försökt begå självmord.

Vad är Addiction Severity Index (ASI)?

ASI är en semistrukturerad intervju som behandlar sju potentiella problemområden för patienter/klienter med alkohol-, narkotika och läkemedelsmissbruk: fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkohol- och narkotikaanvändning, kriminalitet och asocialitet, familj och umgänge samt psykisk hälsa.

På en timme kan man samla viktig information om patientens/klientens problem från de senaste 30 dagarna och tidigare i livet inom samtliga sju områden. ASI erbjuder en övergripande översikt av missbruksrelaterade problem och fokuserar mindre på enskilda områden. Sammanställning av intervjun är alltså viktig för att få fram relevanta fakta.

ASI kan effektivt användas för att upptäcka problem bland vilka individer som helst där missbruk eller beroende uppgivits som ett problem. ASI används huvudsakligen bland vuxna individer som sökt hjälp för alkohol- eller narkotikamissbruk men används också bland gravida kvinnor, psykiskt sjuka, hemlösa och interner.

ASI innehåller cirka 200 frågor och sju subskalor. För korrekt användande krävs utbildning. Informationen behandlas i ett datorprogram vilket möjliggör statistikuttag, textsammanställning och objektiv feedback.

Klinisk användning


ASI är ett utmärkt instrument att använda när det gäller behandlingsplanering och behandlingsutvärdering.

Forskningsanvändning

ASI har använts brett inom forskning och då framförallt när det handlar om kliniska utvärderingsstudier.

Missbruksbokslut 2003-2007


64 % (2189) av de patienter som ingått i materialet har enbart alkohol som huvuddrog. De övriga 1227 har andra droger/eller flera droger som huvuddrog. *Graf 1*



Graf 1


I materialet ingår 36 % kvinnor (1236) och 64 % män (2180) i åldrarna 18 till 74 år. 9 % (308) patienter är i åldern 18-24. Av dessa är 41 % kvinnor (126) och 59 % män (182).

Graf 2




Graf 2

75 % (2563) av 3416 har egen bostad. Endast 2 % (65) är bostadslösa. *Graf 3*



Graf 3

I åldersgruppen 18-24 år har 35 % egen bostad, 44 % bor hos föräldrar, släktingar eller vänner. *Graf 4*



Graf 4

91 % (3104) är svenska medborgare och 84 % (2883) är födda i Sverige.


51 % (1737) har körkort. 49 % (616) av kvinnorna (1236) och 51 % (1121) av männen (2180) har körkort.

De tre senaste åren hade 46 % (569) av kvinnorna och 56 % (1221) av männen varit heltidsarbetande. Endast 2 % (25) av kvinnorna och 3 % (65) av männen hade varit arbetslösa merparten av de tre senaste åren.

I åldersgruppen 18-24 år (308) hade 37 % (47) av kvinnorna och 44 % (80) av männen varit heltidsarbetande de tre senaste åren. 19 % (58) hade varit studerande merparten av de tre senaste åren. Endast 2 % (8) hade varit arbetslösa merparten av de tre senaste åren.

Somatisk sjukdom

45 % (1555) av hela materialet uppgav att de hade en långvarig skada eller en somatisk sjukdom. 47 % (584) av kvinnorna (1236) och 44 % (970) av männen (2180) uppgav att de hade en långvarig skada eller en somatisk sjukdom. *Graf 5*



Graf 5

63 % (2147) av hela materialet hade någon gång gjort ett HIV-test. Av dessa var 39 % (830) kvinnor och 61 % (1309) män.

I åldersgruppen 18-24 år (308) hade 51 % (156) någon gång gjort ett HIV-test. 61 % (77) av kvinnorna (126) i denna åldersgrupp och 43 % (79) av männen (182) i denna åldersgrupp hade någon gång gjort ett HIV-test.


1 % (37) av hela materialet uppgav att de har HIV. 1 % (9) av kvinnorna och 1 % (28) av männen (2180) uppgav att de har HIV.

32 % (1105) av hela materialet var ordinerade att regelbundet ta läkemedel för någon somatisk sjukdom. 37 % (458) av kvinnorna (1236) och 30 % (647) av männen (2180) var ordinerade att regelbundet ta läkemedel för någon somatisk sjukdom.

Rättsliga problem


6,5 % (225) av hela materialet hade villkorlig frigivning eller frivårdspåföljd. 3 % (33) av kvinnorna (1236) och 9 % (192) av männen (2180) hade villkorlig frigivning eller frivårdspåföljd.

14 % (496) av hela materialet har varit åtalade för narkotikabrott 1-5 gånger. *Graf 6*




Graf 6

17 % (571) av hela materialet har varit åtalade för egendomsbrott 1-5 gånger *Graf 7*




Graf 7

15 % (506) av hela materialet har varit åtalade för våldsbrott 1-5 gånger *Graf 8*




Graf 8

22 % (766) av hela materialet har varit åtalade för rattfylleri 1-5 gånger *Graf 9*



Graf 9


19 % (655) av hela materialet har varit omhändertagna enligt lagen om omhändertagande av berusad (LOB). *Graf 10*



Graf 10

Psykisk hälsa


18 % (610) av hela materialet har vårdats inom psykiatrisk slutenvård 1-5 gånger. 24 % (302) av kvinnorna (1236) och 14 % (308) av männen (2180) hade vårdats inom psykiatrisk slutenvård 1-5 gånger. *Graf 11*



Graf 11

I åldrarna 18-24 (308) hade 15 % (46) vårdats inom psykiatrisk slutenvård 1-5 gånger. 43 % (1476) av hela materialet har vårdats inom psykiatrisk öppenvård 1-5 gånger (avser påbörjade vårdepisoder, ej enstaka besök).

54 % (669) av kvinnorna (1236) och 37 % (807) av männen hade vårdats inom psykiatrisk öppenvård 1-5 gånger (avser påbörjade vårdepisoder, ej enstaka besök). *Graf 12*




Graf 12

I åldrarna 18-24 (308) har 47 % (145) vårdats inom psykiatrisk öppenvård 1-5 gånger (avser påbörjade vårdepisoder, ej enstaka besök).

58 % (77) av kvinnorna (126) och 40 % (72) av männen (182) i denna åldersgrupp har vårdats inom psykiatrisk öppenvård 1-5 gånger (avser påbörjade vårdepisoder, ej enstaka besök).


Graf 13



Graf 13

52 % (1781) av hela materialet (3416) har något ordinerat läkemedel för ett eller flera psykiatrisk problem.


64 % (796) av kvinnorna (1236) och 45 % (985) av männen (2180) har något ordinerat läkemedel för ett eller flera psykiatriska problem. *Graf 14*



Graf 14

I åldrarna 18-24 år (308) har 38 % (117) något ordinerat läkemedel för ett eller flera psykiatriska problem.


55 % (69) av kvinnorna (126) och 26 % (48) av männen 182 i denna åldersgrupp har något ordinerat läkemedel för ett eller flera psykiatriska problem. *Graf 15*



Graf 15

52 % (1766) av hela materialet har upplevt allvarlig depression utan att vara påverkade av alkohol eller droger och ej abstinenta.

57 % (711) av kvinnorna (1236) och 48 % (1055) män hade upplevt allvarlig depression utan att vara påverkade av alkohol eller droger och ej abstinenta. **Graf 16**




Graf 16

I åldrarna 18-24 år (308) hade 62 % (190) upplevt allvarlig depression utan att vara påverkade av alkohol eller droger och ej abstinenta.

71 % (89) av kvinnorna (126) och 55 % (101) av männen (182) i denna åldersgrupp har upplevt allvarlig depression utan att vara påverkade av alkohol eller droger och ej abstinenta.


Graf 17



Graf 17

65 % (2232) av hela materialet har haft allvarlig ångest utan att vara påverkade av alkohol eller droger och ej abstinenta.


74 % (915) av kvinnorna (1236) och 60 % (1308) av männen (2180) har haft allvarlig ångest utan att vara påverkade av alkohol eller droger och ej abstinenta. *Graf 18*



Graf 18

I åldrarna 18-24 (308) har 70 % (215) haft allvarlig ångest utan att vara påverkade av alkohol eller droger och ej abstinenta.


82 % (103) av kvinnorna (126) och 62 % (112) av männen (182) har haft allvarlig ångest utan att vara påverkade av alkohol eller droger och ej abstinenta. *Graf 19*



Graf 19

41 % (1416) av hela materialet har upplevt svårigheter att förstå, minnas eller koncentrera sig utan att vara påverkade av alkohol eller droger och ej abstinenta.


46 % (568) av kvinnorna och 39 % (850) av männen 2180 har upplevt svårigheter att förstå, minnas eller koncentrera sig utan att vara påverkade av alkohol eller droger och ej abstinenta.
Graf 20



Graf 20

I åldersgruppen 18-24 år (308) har 52 % (159) upplevt svårigheter att förstå, minnas eller koncentrera sig utan att vara påverkade av alkohol eller droger och ej abstinenta.


58 % (73) av kvinnorna (126) och 47 % (86) av männen (182) har upplevt svårigheter att förstå, minnas eller koncentrera sig utan att vara påverkade av alkohol eller droger och ej abstinenta. **Graf 21**



Graf 21

27 % (910) av hela materialet har haft svårigheter att kontrollera våldsamt beteende utan att vara påverkade av alkohol eller droger och ej abstinenta.


25 % (312) av kvinnorna (1236) och 27 % (598) av männen har haft svårigheter att kontrollera våldsamt beteende utan att vara påverkade av alkohol eller droger och ej abstinenta. *Graf 22*



Graf 22

I åldersgruppen 18-24 (308) har 46 % (141) haft svårigheter att kontrollera våldsamt beteende utan att vara påverkade av alkohol eller droger och ej abstinenta.


48 % (61) av kvinnorna (126) och 44 % (80) av männen (182) i denna åldersgrupp har haft svårigheter att kontrollera våldsamt beteende utan att vara påverkade av alkohol eller droger och ej abstinenta. *Graf 23*



Graf 23

43 % (1470) av hela materialet har haft allvarligt menade självmordstankar utan att vara påverkade av alkohol eller droger och ej abstinenta.


51 % (633) av kvinnorna (1236) och 38 % (836) av männen (2180) har haft allvarligt menade självmordstankar utan att vara påverkade av alkohol eller droger och ej abstinenta. *Graf 24*



Graf 24

I åldersgruppen 18-24 (308) har 50 % (153) haft allvarlig menade självmordstankar utan att vara påverkade av alkohol eller droger och ej abstinenta.

60 % (76) av kvinnorna (126) och 42 % (77) av männen (182) har haft allvarligt menade självmordstankar utan att vara påverkade av alkohol eller droger och ej abstinenta. *Graf 25*




Graf 25

22 % (762) av hela materialet har försökt begå självmord.

51 % (391) av 762 självmordsförsök gjordes av kvinnor.

32 % (391) av kvinnorna (1236) har försökt begå självmord. *Graf 26*

17 % (371) av männen (2180) har försökt begå självmord. *Graf 26*




Graf 26

38 % av kvinnorna (126) i åldersgruppen 18-24 har gjort allvarligt menade suicidförsök.

15 % av männen (182) i åldersgruppen 18-24 har gjort allvarligt menade suicidförsök.


Graf 27



Graf 27


Familj & Umgänge

Nuvarande levnadsförhållande. Graf 28




Graf 28

Lever du tillsammans med någon som missbrukar alkohol. Graf 29



Graf 29


Lever du tillsammans med någon som missbrukar icke ordinerade narkotiska preparat. *Graf 30*



Graf 30

Fritid

Med vem tillbringar du största delen av din fritid. *Graf 31*



Graf 31

Missbruk och psykiatriska problem i släkten

16 % (552) av hela materialet hade en mor med alkoholproblem

6 % (206) av hela materialet hade en mor med narkotikaproblem

15 % (517) av hela materialet hade en mor med psykiska besvär

4 % (151) av hela materialet hade en mormor med alkoholproblem

1 % (45) av hela materialet hade en mormor med narkotikaproblem

5 % (156) av hela materialet hade en mormor med psykiska besvär

17 % (598) av hela materialet hade en morfar med alkoholproblem

0 % (15) av hela materialet hade en morfar med narkotikaproblem

2 % (83) av hela materialet hade en morfar med psykiska besvär

40 % (1374) av hela materialet hade en far med alkoholproblem

6 % (202) av hela materialet hade en far med narkotikaproblem

9 % (291) av hela materialet hade en far med psykiska problem

4 % (131) av hela materialet hade en farmor med alkoholproblem

1 % (44) av hela materialet hade en farmor med narkotikaproblem


3 % (102) av hela materialet hade en farmor med psykiska besvär

18 % (601) av hela materialet hade en farfar med alkoholproblem

4 % (121) av hela materialet hade en farfar med narkotikaproblem

2 % (75) av hela materialet hade en farfar med psykiska besvär

Graf 32



Graf 32

Droganvändning

15 % (523) av hela materialet hade använt heroin.

1,5 % (52) av hela materialet hade använt heroin regelbundet.

21 % (717) av hela materialet hade någon gång tagit andra opiater/smärtstillande (icke ordinerade)

2 % (72) av hela materialet hade regelbundet använt andra opiater/smärtstillande (icke ordinerade)

30 % (1034) av hela materialet hade någon gång använt Benzodiazepiner/sedativa/hypnotika

4 % (129) av hela materialet hade regelbundet använt Benzodiazepiner/sedativa/hypnotika

19 % (659) av hela materialet hade någon gång använt kokain.

1 % (43) av hela materialet hade regelbundet använt kokain


30 % (1010) av hela materialet hade någon gång använt amfetamin

3 % (92) av hela materialet hade regelbundet använt amfetamin

41 % (1396) av hela materialet hade någon gång använt cannabis

4 % (130) av hela materialet hade regelbundet använt cannabis

Graf 33




Graf 33

Intravenöst missbruk

19 % (644) av hela materialet hade någon gång injicerat någon drog.


13 % (158) av kvinnorna (1236) och 24 % (486) av männen (2240) hade någon gång injicerat någon drog. *Graf 34*



Graf34

I åldrarna 18-24 år (308) hade 17 % (53) någon gång injicerat någon drog.

13 % (16) av kvinnorna (126) och 20 % (37) av männen (182) i denna åldersgrupp hade någon gång injicerat någon drog. *Graf 35*



Graf 35



mariaberoendecentrum

Maria Beroendecentrum AB
Box 17531 / 118 91 Stockholm / Växel 08-616 53 00 / Fax 08-616 54 20
E-post: namn.efternamn@mbab.se / www.mariaberoendecentrum.se